

הנחיות לבדיקת סורק ממוחשב (C.T.)

לקראת הבדיקה עליך להצטייד:

1. מכתב הפנייה מרופא/ה.
2. תעודה מזהה כגון: תעודת זהות, רישיון נהיגה.
3. טופס התחייבות (טופס 17) ממרפאת שירותי בריאות כללית או טופס התחייבות מגורם מוסמך אחר. ללא התחייבות יהיה עליך להפקיד מזומן או שובר כרטיס אשראי, עד להבאת התחייבות, או לשאת בהוצאות הבדיקה.
4. יש להביא אתך תוצאות של בדיקות דימות קודמות, המתייחסות לבדיקה הנוכחית, או כל מסמך רפואי רלוונטי אחר.
5. יש להביא אתך רשימת תרופות שהנך נוטלת באופן קבוע.
6. נבדקים מעל גיל 50, יש להביא תוצאות של בדיקת דם עדכניות, כולל תוצאות תפקודי כליה (תקופה של עד 3 חודשים).
- נבדקים עם בעיה כלייתית ידועה, או לקראת בדיקת אורוגרפיה, עליהם להביא תוצאות בדיקת תפקודי כליה עדכנית כני"ל, בכל גיל.
- בדיקות דם אינן נחוצות לקראת צילומים או בדיקות אורטופדיות (כגון צילומי עמוד שדרה או גפיים), שנעשות ללא הזרקת חומר ניגוד.
7. נבדקים מוגבלים או קטינים חייבים לבוא בליווי אפוטרופוס.

הנחיות לקראת ביצוע בדיקות ה-C.T השונות:

<u>בדיקת בטן ואגן</u>	<u>בדיקת מח, צוואר, עיניים, תעלות שמע, סינוסים, בית חזה, רקמות רכות, אנגיו</u>	<u>בדיקת עמוד שדרה (חוליות) ובדיקת עצמות הגפיים</u>
<ul style="list-style-type: none"> - יש להיות בצום של 6 שעות לפני מועד הבדיקה (לקראת הזרקה לווריד של חומר ניגוד המכיל יוד). - בחלק מבדיקות אלה, על הנבדק לשתות חומר ניגוד, תהליך שיכול להמשך כשעתיים. - נבדקים המוזמנים לסניפים בני ברק ומגדלי המאה, יש להגיע בשעת הזימון, לצורך שתיית חומר. - נבדקים המוזמנים לסניפים לניאדו וקריון, יש להגיע שעתיים לפני שעת הזימון, לצורך שתיית חומר. 	<p style="text-align: center;">יש להיות בצום של 6 שעות לפני מועד הבדיקה (לקראת הזרקה לווריד של חומר ניגוד המכיל יוד).</p>	<p style="text-align: center;">אין צורך בהכנה לקראת הבדיקה.</p>

הערות כלליות:

1. במהלך הצום מותר לשתות מים בלבד (כוס אחת).
2. לא ניתן לבצע בדיקת CT של הבטן, אגן או עמוד שדרה מותני, אצל אנשים אשר עשו בדיקת ושת, קיבה ותריסריון, מעי דק עם בריום או בדיקת חוקן בריום, במהלך עשרת הימים שקודם לבדיקה. במקרה זה יש לקבוע מועד חדש לבדיקה.
3. נבדקים/ות הסובלים/ות מאסטמה או חולי סוכרת המטופלים/ות במטפורמין – עליהם לפנות לרופא/ה המטפלת/לשם קבלת הנחיות מיוחדות לקראת הבדיקה עם חומר הניגוד (ראה במצורף הפניה לרופא/ה המטפלת/ת).
4. באם ידוע על רגישות ליוד, יש לבצע את הבדיקה במסגרת בית חולים (לגבי בדיקות שבהן נדרשת הזרקת חומר ניגוד).
5. במקרה של ביטול התור, נבקשך להודיע לנו על כך 48 שעות מראש.
6. יש להמשיך ולקחת את התרופות הרגילות במשך הצום שלפני הבדיקה.
7. לבדיקת CT לפני השתלת שיניים אין צורך בהכנה מיוחדת.

לרופא/ה המטפלת/ת:

1. **כהכנה לבדיקה עם חומר ניגוד מומלץ עבור חולי אסטמה:**
 ביום שלפני הבדיקה בשעה 16:00 לערך: TAB PREDNISON 30-40 MG
 בלילה שלפני הבדיקה: TAB PREDNISON 30-40 MG
 בבוקר יום הבדיקה: TAB PREDNISON 30-40 MG וכן כדור אחד של לורסטין (Lorastin).
2. **לחולי סוכרת המטופלים בטבליות מטפורמין (גלוקופאג'):**
 עליהם להמשיך בטיפול הרגיל עד ליום הבדיקה. יש להפסיק הטיפול במטפורמין למשך 48 השעות הבאות, ואז לבצע בדיקת תפקודי כליה. באם התפקוד תקין ניתן לחדש את הטיפול במטפורמין.
 חולים המטופלים באינסולין עליהם להמשיך בטיפול כרגיל.

**יחידת ה-C.T עומדת לשרותכם,
לקבלת פרטים ומידע נוספים בימים:**

א'-ה' 8:00-19:00, יום ו' 8:00-13:00

טל': 31-70-30-31-700-1, *3171

כתובות הסניפים:

טל: 03-5772555	דרך זיבוטינסקי 7, בני ברק	מור בני ברק
טל: 04-8748080	המייסדים 9, קריית-ביאליק (מרפאת זבולון)	מור קריון
טל: 09-8340341	קריית צאנו, בית חולים לניאדו, נתניה	מור נתניה
טל: 03-7760100	אבן גבירול 124, תל אביב	מור מגדל המאה

**אנו משתדלים מאוד לקבל הנבדקים בשעה שנקבעה,
אך מסיבות רפואיות / טכניות יתכן עיכוב ואנו מודים מראש על סבלנותך.**

יחידת הסורק הממוחשב C.T.

לכבוד

הרופא/ה המטפלת

ד"ר נכבד/ה,

הנדון: הפניה לבדיקת דימות עם הזרקת חומר ניגוד על בסיס יוד לגבי חולי סוכרת המטופלים במטפורמין (גלוקופאג')

בהתאם להנחיות משרד הבריאות (נוהל), יש לפעול כדלקמן בהפניית חולי סוכרת המטופלים במטפורמין:

1. אין צורך להפסיק את לקיחת המטפורמין לפני בדיקת דימות, הכוללת הזרקת תוך ורידית של חומר ניגוד על בסיס יוד.
2. כאשר מזריקים במהלך הבדיקה חומר ניגוד על בסיס יוד, יש להורות על הפסקת לקיחת המטפורמין למשך 48 שעות ממועד ההזרקה.
3. חידוש מתן המטפורמין למטופלת/ת מותנה בבדיקת תפקודי כליות שתיעשה במסגרת קופ"ח. כאשר תפקודי הכליה תקינים, ניתן לחדש את הטיפול במטפורמין.

בכבוד רב,
פרופ' ר. כראל
מנהל רפואי

10-001/0315